

Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 7:

Dựa vào bản đồ treo tường châu Mĩ – Địa lí tự nhiên (hoặc tập bản đồ thế giới và các châu lục), hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung phù hợp:

Dãy Andét là một dãy núi....., nằm ở lục địa Nam Mĩ, chạy dài từ xuống Trên dãy núi có nhiều đỉnh núi cao trên 5000m như.....

Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh, chạy sát gần bờ, nên khí hậu nơi đây hầu như và là nơi nhất châu lục.

Lời giải:

Dãy Andét là một dãy núi **trẻ**, nằm ở **phía Tây** lục địa Nam Mĩ, chạy dài từ **Bắc** xuống **Nam**. Trên dãy núi có nhiều đỉnh núi cao trên 5000m như **Simbôradô, Huacaran, Côrôpuna, Iliampu, Xaladô, Acôncagoa,...**

Do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh **Pêru**, chạy sát gần bờ, nên khí hậu nơi đây hầu như **khô hạn** và là nơi **ít mưa** nhất châu lục.

Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 7:

Dựa vào sơ đồ phân hóa của thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây dãy Andét trong SGK, em hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

SƯỜN TÂY		SƯỜN ĐÔNG	
Thảm thực vật	Độ cao (mét)	Thảm thực vật	Độ cao (mét)
.....	Từ 0m – 1000m	Từ 0m – 1000m
.....	Từ 1000m – 2000m	Từ 1000m – 1300m
.....	Từ 2000m – 3000m	Từ 1300m – 2000m
.....	Từ 3000m – 4000m	Từ 2000m – 3000m
.....	Từ 4000m – 5000m	Từ 3000m – 4000m
.....	Trên 5000m	Từ 4000m – 5000m
		Trên 5000m

Lời giải:

SƯỜN TÂY		SƯỜN ĐÔNG	
Thực vật	Độ cao (mét)	Thực vật	Độ cao (mét)
Thực vật nửa hoang mạc	Từ 0m – 1000m	Rừng nhiệt đới	Từ 0m – 1000m
Cây bụi xương rồng	Từ 1000m – 2000m	Rừng lá rộng	Từ 1000m – 1300m
Đồng cỏ cây bụi	Từ 2000m – 3000m	Rừng lá kim	Từ 1300m – 2000m
Đồng cỏ núi cao	Từ 3000m – 4000m	Rừng lá kim	Từ 2000m – 3000m
Đồng cỏ núi cao	Từ 4000m – 5000m	Đồng cỏ	Từ 3000m – 4000m
Băng tuyết	Trên 5000m	Đồng cỏ núi cao	Từ 4000m – 5000m
		Băng tuyết	Trên 5000m

Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 7:

Em hãy giải thích vì sao lại có sự phân bố khác nhau về thực vật ở hai sườn dãy Anđét.

Lời giải:

Có sự phân bố khác nhau về thực vật ở hai sườn dãy Anđét vì:

- Sườn Đông Anđét có khí hậu ẩm và ấm: đây là khu vực có gió Tín Phong Nam bán cầu thổi quanh năm, do phía đông lục địa Nam Mỹ có địa hình thấp, gió Tín Phong mang hơi ẩm từ biển vào, gặp bức chắn địa hình Anđét, gây mưa nhiều ở sườn Đông Anđét.

- Sườn tây Anđét có khí hậu khô hạn: do dòng biển lạnh Pêru chảy sát ven bờ, các khối không khí ẩm từ biển thổi vào đều ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi vào đến đất liền thì giảm ẩm và không gây mưa, khiến cho sườn Tây Anđét khí hậu khô hạn, ít mưa.