

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và biên soạn dưới đây.

Bộ 10 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Câu 1: Hạn chế của khí hậu nóng ẩm đối với sản xuất nông nghiệp là:

- A. sâu bệnh dễ phát triển, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.
- B. sương muối, giá rét.
- C. hạn hán, thiếu nước vào mùa khô.
- D. động đất, núi lửa thường xuyên xảy ra.

Câu 2: Cây lương thực quan trọng nhất ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa là:

- A. cây lúa mì.
- B. cây ngô.
- C. cây cao lương.
- D. cây lúa nước.

Câu 3; Đặc điểm không đúng về sản xuất nông nghiệp ở đới nóng là:

- A. Vùng thuận lợi cho sản xuất cây lương thực (đặc biệt cây lúa nước) và cây công nghiệp.
- B. Các cây công nghiệp nhiệt đới rất phong phú (cà phê, cao su, mía,...).
- C. Chăn nuôi phát triển hơn trồng trọt và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- D. Phổ biến hình thức chăn thả dê, cừu, trâu, bò trên các đồng cỏ.

Câu 4: Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở vùng đồi núi là:

- A. cây ngô.
- B. cây lúa nước.
- C. cây sắn.
- D. cây khoai lang.

Câu 5: Cây cao su được trồng phổ biến ở khu vực nào sau đây?

- A. Nam Á.
- B. Tây Phi.
- C. Đông Nam Á.
- D. Nam Mỹ.

Câu 6: Chăn nuôi gia súc ở đới nóng chủ yếu phổ biến hình thức:

- A. chăn thả.
- B. công nghiệp.
- C. bán công nghiệp.
- D. chuồng trại.

Câu 7: Quốc gia châu Á có đàn bò và đàn trâu lớn nhất thế giới là:

- A. Trung Quốc.
- B. Ấn Độ.
- C. Bra-xin.
- D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xói mòn đất ở môi trường xích đạo ẩm là:

- A. mất lớp phủ thực vật trong điều kiện nhiệt độ cao, lượng mưa lớn.
- B. con người sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác.
- C. sông ngòi lớn, dòng chảy mạnh.
- D. địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn.

Câu 9: Đâu không phải là biện pháp quan trọng góp phần khắc phục trực tiếp những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp?

- A. Làm thủy lợi.
- B. Trồng rừng che phủ đất.

C. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi.

D. Phát triển công nghiệp chế biến.

Câu 10: Việc bố trí và lựa chọn các loại cây trồng ở môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa bị chi phối bởi lượng mưa và chế độ mưa trong năm. Nguyên nhân sâu xa là do:

A. Lượng mưa có sự phân hóa sâu sắc.

B. Khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm cao.

C. Đất đai đa dạng, màu mỡ.

D. Lượng mưa trung bình năm lớn (trên 1500mm).

Đáp án bộ 10 câu hỏi Địa 7 Bài 9 trắc nghiệm: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Câu 1:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng ẩm, tạo điều kiện cho sâu bệnh dễ phát triển, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Câu 2:

Đáp án cần chọn là: D.

Giải thích:

Cây lương thực quan trọng nhất ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa là cây lúa nước.

Câu 3:

Đáp án cần chọn là: C.

Giải thích:

Đới nóng thuận lợi cho canh tác cây lương thực (đặc biệt cây lúa nước) và cây công nghiệp; các cây công nghiệp nhiệt đới rất phong phú (cà phê, cao su, mía,...), hình thành nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn. Chăn nuôi ở đới nóng phổ biến hình thức chăn thả dê, cừu, trâu, bò trên các đồng cỏ. Nhưng nhìn chung chăn nuôi chưa phát triển bằng trồng trọt.

Câu 4:

Đáp án cần chọn là: C.

Giải thích:

Vùng đồi núi khu vực đới nóng thích hợp để trồng cây sắn.

Câu 5:

Đáp án cần chọn là: C.

Giải thích:

Cây cao su được trồng phổ biến ở khu vực Đông Nam Á.

Câu 6:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Chăn nuôi gia súc ở đới nóng chủ yếu phổ biến hình thức chăn thả.

Câu 7:

Đáp án cần chọn là: B.

Giải thích:

Ấn Độ là quốc gia châu Á có đàn bò và đàn trâu lớn nhất thế giới.

Câu 8:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Môi trường xích đạo ẩm có nhiệt độ và độ ẩm cao nên các chất hữu cơ bị phân hủy nhanh, do vậy tầng mùn mỏng. Trong điều kiện mất lớp phủ thực vật, mưa lớn dễ dàng rửa trôi đất, nhất là trên các sườn dốc làm đất bị xói mòn, trơ sỏi đá.

Câu 9:

Đáp án cần chọn là: D.

Giải thích:

Để trực tiếp khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất nông nghiệp, các biện pháp quan trọng nhất là làm thủy lợi để điều tiết lượng nước tưới vào mùa lũ – cạn, trồng rừng che phủ tránh xói mòn sạt lở đất, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi nên mỗi loại cây trồng vật nuôi khác nhau sẽ thích nghi tốt với sự thay đổi phân hóa của khí hậu.

Câu 10:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa có sự phân hóa lượng mưa theo mùa rõ rệt. Bên cạnh sự phân hóa theo mùa, lượng mưa cũng thay đổi theo không gian, khu vực mưa ít có khu vực mưa nhiều tùy thuộc vào vị trí gần hay xa biển, địa hình đón gió hay khuất gió. Vì vậy, sự phân hóa chế độ mưa theo mùa và theo không gian đã quy định việc bố trí lựa chọn các loại cây khác nhau, có loài cây ưa khô hạn, cần ít nước, có loài cây cần nhiều nước,...